



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP 87240-000

E-mail: saude@terraboa.pr.gov.br

TERRA BOA – PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2025

PROVA OBJETIVA

Cargo: Cirurgião Dentista

Data da aplicação: 18/05/2025

Duração: 3h30min

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Nome Legível do Candidato	RG ou CPF

Terra Boa, _____, _____ de 2025

Assinatura do candidato



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP 87240-000

E-mail: saude@terraboa.pr.gov.br

TERRA BOA – PARANÁ

QUESTÕES

1. A Lei nº 8.080/1990 estabelece os princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS). O princípio que busca reduzir as desigualdades sociais e regionais, oferecendo mais a quem mais precisa, é denominado:

 - A) Universalidade
 - B) Integralidade
 - C) Equidade
 - D) Descentralização

2. A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), conhecida como Brasil Sorridente, reorganizou a atenção à saúde bucal no SUS. Um dos seus componentes essenciais é a implantação de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). Qual o objetivo principal dos CEOs?

 - A) Realizar exclusivamente ações de prevenção e promoção da saúde bucal na atenção básica.
 - B) Oferecer atendimento odontológico de média complexidade, servindo de referência para as Equipes de Saúde Bucal da Atenção Básica.
 - C) Atuar como centros de formação e capacitação para Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal.
 - D) Gerenciar a distribuição de materiais odontológicos para toda a rede municipal de saúde.

3. O índice CPOD (Dentes Cariados, Perdidos e Obturados) é amplamente utilizado em levantamentos epidemiológicos de saúde bucal. O que representa o componente "P" deste índice?

 - A) Dentes com necessidade de tratamento periodontal.
 - B) Dentes permanentes que foram extraídos devido à cárie.
 - C) Dentes com presença de placa bacteriana visível.
 - D) Dentes com lesões de cárie incipientes (manchas brancas).

4. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) vigente estabelece as diretrizes para a organização da Atenção Básica no SUS. Qual das seguintes ações NÃO é considerada uma atribuição essencial das Equipes de Saúde Bucal (eSB) na Atenção Básica?



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP 87240-000

E-mail: saude@terraboia.pr.gov.br

TERRA BOA – PARANÁ

-
- A) Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para indivíduos e grupos.
- B) Realizar procedimentos clínicos odontológicos restauradores, periodontais básicos e cirúrgicos (extrações simples).
- C) Coordenar e realizar o tratamento endodôntico complexo (molares com canais atrésicos) para a população adscrita.
- D) Encaminhar e orientar usuários que necessitam de atendimento especializado nos CEOs ou outros níveis de atenção.
5. A vigilância epidemiológica em saúde bucal é fundamental para o planejamento de ações. Qual indicador é utilizado para avaliar a necessidade de tratamento periodontal em uma população, examinando sangramento gengival, cálculo e profundidade de bolsa em dentes específicos?
- A) Índice CPOD
- B) Índice ceo-d
- C) Índice de Higiene Oral Simplificado (IHO-S)
- D) Índice Periodontal Comunitário (CPI)
6. A Lei nº 5.081, de 24 de agosto de 1966, regula o exercício da Odontologia no Brasil. De acordo com esta lei, compete ao Cirurgião-Dentista:
- A) Prescrever e aplicar exclusivamente especialidades farmacêuticas de uso interno.
- B) Atestar estados mórbidos e outros, para fins exclusivamente trabalhistas (justificar faltas).
- C) Praticar todos os atos pertinentes à Odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação.¹
- D) Realizar perícias médico-legais em qualquer área da medicina.
7. O prontuário odontológico é um documento fundamental com valor legal, científico e de comunicação. Qual dos itens abaixo NÃO é considerado parte obrigatória do prontuário do paciente?
- A) Identificação do paciente.
- B) Anamnese e exame clínico detalhado.
- C) Plano de tratamento proposto e executado.
- D) Radiografias e exames complementares realizados.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP 87240-000

E-mail: saude@terraboa.pr.gov.br

TERRA BOA – PARANÁ

8. De acordo com o risco de transmissão de infecção, os artigos odontológicos são classificados em críticos, semicríticos e não críticos. Um fórceps utilizado em cirurgia de extração dentária é classificado como:
- A) Não crítico, requerendo apenas limpeza.
 - B) Semicrítico, requerendo desinfecção de alto nível.
 - C) Crítico, requerendo esterilização.
 - D) Artigo descartável, devendo ser eliminado após o uso.
9. Qual método de esterilização é considerado o mais seguro e eficaz para a maioria dos instrumentos odontológicos termorresistentes, utilizando vapor saturado sob pressão?
- A) Estufa de calor seco.
 - B) Autoclave a vapor.
 - C) Imersão em glutaraldeído a 2% por 10 horas.
 - D) Fervura em água por 30 minutos.
10. Para a desinfecção de superfícies clínicas (bancadas, refletor, cadeira) que podem ter sido contaminadas durante o atendimento odontológico, qual produto é comumente recomendado e eficaz contra a maioria dos patógenos de interesse, incluindo o vírus da hepatite B (HBV)?
- A) Água sanitária (hipoclorito de sódio) diluída a 0,01%.
 - B) Álcool etílico a 70% (p/p ou v/v).
 - C) Sabão líquido neutro.
 - D) Glutaraldeído a 2%.
11. Os anestésicos locais utilizados em odontologia são classificados quimicamente em dois grupos principais, o que influencia seu metabolismo e potencial alergênico. A lidocaína, mepivacaína e articaína pertencem a qual grupo?
- A) Grupo Éster
 - B) Grupo Amida
 - C) Grupo Amina Terciária



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP 87240-000

E-mail: saude@terraboia.pr.gov.br

TERRA BOA – PARANÁ

D) Grupo Barbitúrico

12. A epinefrina é o vasoconstritor mais comum associado aos anestésicos locais. Em qual das seguintes condições sistêmicas do paciente o uso de anestésicos com epinefrina deve ser evitado ou utilizado com extrema cautela (dose mínima)?
- A) Diabetes Mellitus tipo 1 controlado.
 - B) Hipertireoidismo não controlado ou tireotoxicose.
 - C) Asma brônquica persistente leve.
 - D) História de alergia à penicilina.
13. Os AINEs são frequentemente prescritos em odontologia para controle da dor e inflamação pós-operatória. Qual o principal mecanismo de ação desses fármacos?
- A) Bloqueio dos receptores opioides no sistema nervoso central.
 - B) Inibição da enzima ciclooxigenase (COX), reduzindo a síntese de prostaglandinas.
 - C) Estimulação da liberação de endorfinas endógenas.
 - D) Bloqueio dos canais de sódio nos nervos periféricos.
14. A amoxicilina é um antibiótico beta-lactâmico amplamente utilizado em infecções odontogênicas. A associação da amoxicilina com o clavulanato de potássio tem qual objetivo principal?
- A) Aumentar a absorção gastrointestinal da amoxicilina.
 - B) Reduzir os efeitos colaterais gastrointestinais da amoxicilina.
 - C) Inibir as beta-lactamases produzidas por algumas bactérias, restaurando a eficácia da amoxicilina contra cepas resistentes.
 - D) Prolongar a meia-vida plasmática da amoxicilina.
15. Os Cimentos de Ionômero de Vidro (CIV) possuem propriedades únicas. Qual das seguintes características NÃO é típica dos CIVs convencionais?
- A) Adesão química à estrutura dental (esmalte e dentina).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP 87240-000

E-mail: saude@terraboia.pr.gov.br

TERRA BOA – PARANÁ

- B) Liberação de íons flúor ao longo do tempo.
- C) Coeficiente de expansão térmica similar ao do dente.
- D) Necessidade de sistema adesivo (primer/bond) para retenção.

16. O alginato (hidrocoloide irreversível) é um material de moldagem amplamente utilizado para obtenção de modelos de estudo e antagonistas. Qual fenômeno pode ocorrer se o molde de alginato for exposto ao ar por tempo prolongado antes do vazamento do gesso, comprometendo sua precisão dimensional?

- A) Sinérese (perda de água)
- B) Embebição (absorção de água)
- C) Histerese (diferença de temperatura gel-sol)
- D) Polimerização por adição

17. Para lesões de cárie incipientes (manchas brancas ativas) em superfícies lisas ou proximais, qual abordagem terapêutica é considerada a mais conservadora e apropriada como primeira escolha?

- A) Restauração com resina composta.
- B) Aplicação de selante resinoso sobre a lesão.
- C) Controle profissional do biofilme, orientação de higiene oral e aplicação tópica de flúor (verniz ou gel).
- D) Preparo cavitário e restauração com cimento de ionômero de vidro.

18. Os princípios modernos de preparo cavitário para restaurações adesivas enfatizam a máxima preservação da estrutura dental sadia. Qual conceito reflete essa abordagem?

- A) Extensão para prevenção (G.V. Black).
- B) Preparo cavitário baseado exclusivamente na remoção do tecido cariado.
- C) Forma de conveniência ampla para facilitar a inserção do material.
- D) Paredes expulsivas em todos os preparos.

19. A correta fotopolimerização das resinas compostas é crucial para o sucesso clínico das restaurações. Qual fator NÃO influencia diretamente a eficácia da polimerização?



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP 87240-000

E-mail: saude@terraboia.pr.gov.br

TERRA BOA – PARANÁ

- A) Intensidade da luz emitida pelo aparelho fotopolimerizador.
- B) Tempo de exposição à luz.
- C) Distância e angulação da ponta do aparelho em relação à resina.
- D) Cor e opacidade da resina composta.

20. A cárie radicular é uma condição prevalente em idosos. Além da exposição da raiz devido à retração gengival, qual outro fator contribui significativamente para o desenvolvimento dessas lesões?

- A) Menor teor mineral do cimento e dentina radicular em comparação ao esmalte.
- B) Aumento da produção de saliva com a idade.
- C) Dieta rica em proteínas e pobre em carboidratos.
- D) Uso regular de fio dental.

21. O hidróxido de cálcio $[Ca(OH)_2]$ é a medicação intracanal mais utilizada entre sessões no tratamento endodôntico. Qual sua principal propriedade terapêutica?

- A) Promover a dissolução de tecido pulpar necrótico remanescente.
- B) Estimular a formação de tecido de granulação na região periapical.
- C) Possuir ação analgésica potente.
- D) Possuir elevado pH (alcalino) com consequente ação antimicrobiana e indução de mineralização (em certas condições).

22. Durante o preparo biomecânico (ou químico-mecânico) dos canais radiculares, qual o objetivo principal da utilização de soluções irrigadoras como o hipoclorito de sódio (NaOCl)?

- A) Apenas lubrificar os instrumentos endodônticos.
- B) Promover a quebra da smear layer.
- C) Promover a dissolução de tecido orgânico (polpa vital ou necrótica, microrganismos) e ter ação antimicrobiana.
- D) Estimular a formação de uma barreira apical de cimento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP 87240-000

E-mail: saude@terraboia.pr.gov.br

TERRA BOA – PARANÁ

-
- 23.** O objetivo da obturação do sistema de canais radiculares é preencher tridimensionalmente o espaço preparado, selando-o para prevenir a reinfecção. Qual material é considerado o padrão-ouro para a obturação de canais radiculares?
- A)** Cimento de Óxido de Zinco e Eugenol (OZE).
 - B)** Guta-percha associada a um cimento obturador.
 - C)** Cimento de Ionômero de Vidro (CIV).
 - D)** Resina composta fluida.
- 24.** Um paciente apresenta dor intensa, espontânea e pulsátil em um dente com necrose pulpar, edema facial localizado e sensibilidade extrema à percussão vertical. Radiograficamente, pode haver um discreto espessamento do ligamento periodontal apical. Qual o diagnóstico mais provável e a conduta de urgência inicial?
- A)** Pulpite irreversível sintomática; pulpectomia.
 - B)** Periodontite apical crônica; observação.
 - C)** Abscesso periapical agudo; acesso endodôntico para drenagem via canal e/ou incisão e drenagem do edema, associado a medicação sintomática.
 - D)** Cisto periapical; enucleação cirúrgica.
- 25.** Qual sinal clínico é considerado o principal indicador da presença de gengivite induzida por biofilme?
- A)** Presença de bolsa periodontal profunda (> 5mm).
 - B)** Mobilidade dentária aumentada.
 - C)** Sangramento à sondagem periodontal.
 - D)** Perda de inserção clínica visível.
- 26.** A principal diferença entre gengivite e periodontite induzidas por biofilme reside na:
- A)** Presença de cálculo supragengival.
 - B)** Intensidade do sangramento gengival.
 - C)** Cor da gengiva inflamada (vermelho vivo vs. vermelho-azulado).
 - D)** Ocorrência de perda de inserção clínica e perda óssea alveolar (presentes na periodontite, ausentes na gengivite).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP 87240-000

E-mail: saude@terraboa.pr.gov.br

TERRA BOA – PARANÁ

-
- 27. Tratamento Periodontal Não Cirúrgico** Enunciado: A terapia periodontal não cirúrgica (raspagem e alisamento radicular - RAR) tem como objetivo principal:
- A) Eliminar completamente as bolsas periodontais através de gengivectomia.
 - B) Promover a regeneração óssea alveolar.
 - C) Remover o biofilme e o cálculo supra e subgengival das superfícies dentárias, reduzindo a carga bacteriana e a inflamação.
 - D) Clarear as superfícies radiculares expostas.
- 28.** O biofilme dental é uma comunidade microbiana complexa aderida às superfícies dentárias. Qual grupo de bactérias é considerado pioneiro na colonização da película adquirida, iniciando a formação do biofilme supragengival?
- A) Espiroquetas (ex: *Treponema denticola*)
 - B) Bacilos Gram-negativos anaeróbios estritos (ex: *Porphyromonas gingivalis*)
 - C) Cocos e bacilos Gram-positivos facultativos (ex: *Streptococcus sanguinis*, *Actinomyces naeslundii*)
 - D) Fungos (ex: *Candida albicans*)
- 29.** Qual das seguintes situações representa uma indicação clássica para a extração de um dente permanente?
- A) Lesão de cárie incipiente em esmalte.
 - B) Dente com pulpite irreversível, passível de tratamento endodôntico.
 - C) Dente hígido em posição correta na arcada.
 - D) Dente com extensa destruição coronária e comprometimento radicular que impossibilita tratamento restaurador ou endodôntico adequado.
- 30.** Qual tipo de biópsia é indicado para lesões extensas ou quando há suspeita de malignidade, onde apenas uma parte representativa da lesão, incluindo tecido normal adjacente, é removida para análise histopatológica?
- A) Biópsia excisional.
 - B) Biópsia incisional.
 - C) Citologia esfoliativa.
 - D) Punção aspirativa por agulha fina (PAAF).